Chou Romanesco et Autosimilarité

Yanick Heurteaux

Laboratoire de Mathématiques

Université Blaise Pascal

Plan de l'exposé

- Qu'est ce que l'autosimilarité
 - ensembles autosimilaires
 - autosimilarité statistique
 - autosimilarité approchée
- Un outil d'analyse : la notion de dimension
- Au-delà des ensembles : les mesures
- Quelques mots sur l'analyse multifractale

Les nombres entiers

0, 1, 2, 3,, n, n+1,

Les nombres entiers

0, 1, 2, 3,, n, n+1,

n+1 est le **successeur** de n

Les nombres entiers

0, 1, 2, 3,, n, n+1,

n+1 est le **successeur** de n

Les nombres entiers s'ajoutent

Les nombres entiers

0, 1, 2, 3,, n, n+1,

n+1 est le **successeur** de n

Les nombres entiers s'ajoutent

Les nombres entiers se multiplient

Les nombres réels

Un nombre réel est un nombre
qui s'écrit avec une infinité de décimales

Les nombres réels

Un nombre réel est un nombre
qui s'écrit avec une infinité de décimales

$e, d_1 d_2 d_3 d_4 \dots d_n \dots$

Les nombres réels

Un nombre réel est un nombre
qui s'écrit avec une infinité de décimales

$e, d_1 d_2 d_3 d_4 \dots d_n \dots$

Par exemple, le nombre π

Les nombres réels

Un nombre réel est un nombre
qui s'écrit avec une infinité de décimales

$$e, d_1 d_2 d_3 d_4 \dots d_n \dots$$

Par exemple, le nombre π

$$\pi = 3,1415926535897932384626433832795 \dots$$

Vers l'infiniment grand ou l'infiniment petit

... 1/16 1/8 1/4 1/2 **1** 2 4 8 16 ...

Vers l'infiniment grand ou l'infiniment petit

... 1/16 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 16 ...

... 2^{-n} ... 2^{-3} 2^{-2} 2^{-1} 2^0 2^1 2^2 2^3 ... 2^n 2^{n+1} ...

Vers l'infiniment grand ou l'infiniment petit

... 1/16 1/8 1/4 1/2 **1** 2 4 8 16 ...

... 2^{-n} ... 2^{-3} 2^{-2} 2^{-1} 2^0 2^1 2^2 2^3 ... 2^n 2^{n+1} ...

... a^{-n} ... a^{-3} a^{-2} a^{-1} a^0 a^1 a^2 a^3 ... a^n a^{n+1} ...

Vers l'infiniment grand ou l'infiniment petit

... 1/16 1/8 1/4 1/2 **1** 2 4 8 16 ...

... 2^{-n} ... 2^{-3} 2^{-2} 2^{-1} 2^0 2^1 2^2 2^3 ... 2^n 2^{n+1} ...

... a^{-n} ... a^{-3} a^{-2} a^{-1} a^0 a^1 a^2 a^3 ... a^n a^{n+1} ...

$$a^{b+c} = a^b a^c$$

Vers l'infiniment grand ou l'infiniment petit

... 1/16 1/8 1/4 1/2 **1** 2 4 8 16 ...
... 2^{-n} ... 2^{-3} 2^{-2} 2^{-1} 2^0 2^1 2^2 2^3 ... 2^n 2^{n+1} ...

... a^{-n} ... a^{-3} a^{-2} a^{-1} a^0 a^1 a^2 a^3 ... a^n a^{n+1} ...

$$a^{b+c} = a^b a^c$$

$d = a^b$ s'écrit aussi $b = \log_a(d)$

Les échelles dans l'univers

10^0 mètre = 1 mètre

Les échelles dans l'univers

10^3 mètres = 1 kilomètre

10^0 mètre = 1 mètre

Les échelles dans l'univers

10^{16} mètres = 1 année lumière

10^3 mètres = 1 kilomètre

10^0 mètre = 1 mètre

Les échelles dans l'univers

10^{23} mètres = on observe les fins fonds de l'univers

10^{16} mètres = 1 année lumière

10^3 mètres = 1 kilomètre

10^0 mètre = 1 mètre

Les échelles dans l'univers

10^{23} mètres = on observe les fins fonds de l'univers

10^{16} mètres = 1 année lumière

10^3 mètres = 1 kilomètre

10^0 mètre = 1 mètre

10^{-3} mètre = 1 millimètre

Les échelles dans l'univers

10^{23} mètres = on observe les fins fonds de l'univers

10^{16} mètres = 1 année lumière

10^3 mètres = 1 kilomètre

10^0 mètre = 1 mètre

10^{-3} mètre = 1 millimètre

10^{-6} mètre = 1 micron, la taille d'un noyau de cellule

Les échelles dans l'univers

10^{23} mètres = on observe les fins fonds de l'univers

10^{16} mètres = 1 année lumière

10^3 mètres = 1 kilomètre

10^0 mètre = 1 mètre

10^{-3} mètre = 1 millimètre

10^{-6} mètre = 1 micron, la taille d'un noyau de cellule

10^{-16} mètre = on observe les quarks

La boîte de vache qui rit

Qu'est ce qu'une similitude ?

Une **homothétie**, c'est une contraction ou une dilatation

Qu'est ce qu'une similitude ?

Une **homothétie**, c'est une contraction ou une dilatation

Une **similitude directe**, c'est la conjonction d'une homothétie et d'une rotation

Qu'est ce qu'une similitude ?

Une **homothétie**, c'est une contraction ou une dilatation

Une **similitude directe**, c'est la conjonction d'une homothétie et d'une rotation

Qu'est ce qu'une similitude ?

Une **homothétie**, c'est une contraction ou une dilatation

Une **similitude directe**, c'est la conjonction d'une homothétie et d'une rotation

Qu'est ce qu'une similitude ?

Une **similitude indirecte**, c'est la conjonction d'une homothétie et d'un effet miroir

Qu'est ce qu'une similitude ?

Une **similitude indirecte**, c'est la conjonction d'une homothétie et d'un effet miroir

Qu'est ce qu'une similitude ?

Une **similitude indirecte**, c'est la conjonction d'une homothétie et d'un effet miroir

Qu'est ce qu'un objet autosimilaire ?
un exemple : le carré

Qu'est ce qu'un objet autosimilaire ?

un exemple : le carré

Qu'est ce qu'un objet autosimilaire ?
un exemple : le carré

Le carré est réunion de 4 copies de lui-même
dans un rapport de contraction $1/2$

Le triangle isocèle rectangle

Le triangle isocèle rectangle

Le triangle isocèle rectangle

Une autre façon de voir
le triangle isocèle rectangle

Une autre façon de voir
le triangle isocèle rectangle

Une autre façon de voir
le triangle isocèle rectangle

Une autre façon de voir
le triangle isocèle rectangle

Une autre façon de voir le triangle isocèle rectangle

$$a^2 = b^2 + c^2 \quad \text{donc} \quad a^2 = 2b^2 = 2c^2, \quad b = c = a/\sqrt{2}$$

Le triangle isocèle rectangle

On voit $N=4$ copies
du triangle
dans un rapport $r=1/2$

On voit $N=2$ copies
du triangle
dans un rapport $r=1/\sqrt{2}$

$$N \times r^2 = 1$$

Le triangle rectangle

Le triangle rectangle

Le triangle rectangle

Le triangle rectangle

Le triangle rectangle est réunion de 2 copies de lui-même, l'une dans un rapport b/a et l'autre dans un rapport c/a

Le triangle rectangle

La surface S vérifie $S = \frac{b^2}{a^2} S + \frac{c^2}{a^2} S$

C'est le théorème de Pythagore !

Et maintenant, si on cherchait à dupliquer le carré en 4 copies dans le rapport de contraction $1/3$?

Et maintenant, si on cherchait à dupliquer le carré en 4 copies dans le rapport de contraction $1/3$?

Et maintenant, si on cherchait à dupliquer le carré en 4 copies dans le rapport de contraction $1/3$?

Et maintenant, si on cherchait à dupliquer le carré en 4 copies dans le rapport de contraction $1/3$?

L'objet limite est un ensemble de Cantor

Le triangle de Sierpinski

Le triangle de Sierpinski

Le triangle de Sierpinski dans la nature

Le triangle de Sierpinski
est une courbe !

Le triangle de Sierpinski
est une courbe !

Le triangle de Sierpinski est une courbe !

Le triangle de Sierpinski
est une courbe !

Le triangle de Sierpinski
est une courbe !

Le triangle de Sierpinski
est une courbe !

Le triangle de Sierpinski
est une courbe !

Le triangle de Sierpinski
est une courbe !

Le triangle de Sierpinski
est une courbe !

Triangle de Sierpinski et triangle de Pascal

$$(a+b)^2 = 1a^2 + 2ab + 1b^2$$

Triangle de Sierpinski et triangle de Pascal

$$(a+b)^2 = 1a^2 + 2ab + 1b^2$$

$$(a+b)^3 = 1a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + 1b^3$$

Triangle de Sierpinski et triangle de Pascal

$$(a+b)^2 = 1a^2 + 2ab + 1b^2$$

$$(a+b)^3 = 1a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + 1b^3$$

La courbe de Von Koch

La courbe de Von Koch

La courbe de Von Koch

La courbe de Von Koch

La courbe de Von Koch

La courbe de Von Koch

La courbe de Von Koch

La courbe de Von Koch est réunion de **4** copies d'elle même dans un rapport de contraction **1/3**

Des courbes de Von Koch à la courbe de Péano

rapport 33/100

rapport 40/100

rapport 43/100

rapport 47/100

rapport 50/100

Des courbes de Von Koch à la courbe de Péano

rapport 33/100

rapport 40/100

rapport 43/100

rapport 47/100

rapport 50/100

La courbe de Péano : mouvement de base

Le point passe de la position 0 à la position 4 en passant par les positions 1, 2 et 3

La courbe de Péano : deuxième génération

La courbe de Péano : deuxième génération

La courbe de Péano : deuxième génération

La courbe de Péano : deuxième génération

La courbe de Péano : deuxième génération

La courbe de Péano : deuxième génération

La courbe de Péano : deuxième génération

La courbe de Péano : deuxième génération

La courbe de Péano : deuxième génération

La courbe de Péano : deuxième génération

La courbe de Péano : deuxième génération

La courbe de Péano : deuxième génération

La courbe de Péano : deuxième génération

La courbe de Péano : deuxième génération

La courbe de Péano : deuxième génération

La courbe de Péano : deuxième génération

La courbe de Péano : deuxième génération

La courbe de Péano

La courbe de Péano
3^{ème} génération

La courbe de Péano
5^{ème} génération
en cours de réalisation

Jeu de pile ou face : la fortune du joueur

Le joueur joue à pile ou face.
Il gagne **1€** avec probabilité **1/2**
et en perd **1** avec probabilité **1/2**

Jeu de pile ou face : la fortune du joueur

Le joueur joue à pile ou face.
Il gagne **1€** avec probabilité **1/2**
et en perd **1** avec probabilité **1/2**

X_i : gain (ou perte) au i -ème jeu

Jeu de pile ou face : la fortune du joueur

Le joueur joue à pile ou face.
Il gagne **1€** avec probabilité **1/2**
et en perd **1** avec probabilité **1/2**

X_i : gain (ou perte) au i -ème jeu

$S_n = X_1 + \dots + X_n$: fortune du joueur

Jeu de pile ou face : la fortune du joueur

Le joueur joue à pile ou face.
Il gagne 1€ avec probabilité $1/2$
et en perd 1 avec probabilité $1/2$

X_i : gain (ou perte) au i -ème jeu

$S_n = X_1 + \dots + X_n$: fortune du joueur

$X_i = -1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, \dots$

$S_n = -1, -2, -1, -2, -1, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 2, 3, \dots$

Le principe de renormalisation

Marche à 20 pas

Le principe de renormalisation

On renormalise
d'un facteur **20** en abscisse
et d'un facteur $\sqrt{20}$ en ordonnée

Marche à **20** pas

Le principe de renormalisation

Marche à 20 pas

Marche à 20 pas renormalisée

De la fortune du joueur au mouvement brownien

Marche à 20 pas renormalisée

Marche à 200 pas renormalisée

Marche à 2000 pas renormalisée

Le mouvement brownien

Statistiquement :

$$B(t) = \frac{1}{\sqrt{n}} B(nt)$$

$$B(t_0 + t) - B(t_0) = B(t)$$

Le mouvement brownien

Robert Brown, 1773-1858

Vers le mouvement brownien en dimension 2

Marche à 200 pas

Marche à 2000 pas

Marche à 20000 pas

A chaque étape, on accélère le mouvement d'un facteur n
et on contracte la trajectoire d'un facteur $\sqrt{n}$

Une trajectoire brownienne en dimension 2

Statistiquement : $B(t) = \frac{1}{\sqrt{n}} B(nt)$

Autosimilarité approchée

Un outil d'analyse : la dimension

$N(a)$ = nombre de disques de rayon a nécessaires pour recouvrir la courbe

Un outil d'analyse : la dimension

$N(a)$ = nombre de disques de rayon a nécessaires pour recouvrir la courbe

On recouvre la courbe par des disques de rayon a

$$L \approx N(a) \times a$$

Un outil d'analyse : la dimension

$N(a)$ = nombre de disques de rayon a nécessaires pour recouvrir la courbe

On recouvre la courbe par des disques de rayon $a/2$

$$L \approx N(a/2) \times a/2$$

Un outil d'analyse : la dimension

$N(a)$ = nombre de disques de rayon a nécessaires pour recouvrir la courbe

$$N(a) \times a^1 \approx N(a/2) \times (a/2)^1 \approx N(r) \times r^1$$

La dimension de la courbe vaut **1**

La courbe de Von Koch

La courbe de Von Koch

La courbe de Von Koch

$$N(a/3) = 4 \times N(a)$$

La courbe de Von Koch

$$N(a/3) = 4 \times N(a)$$

$$N(a/3^n) = 4^n \times N(a)$$

La courbe de Von Koch

$$N(a/3) = 4 \times N(a)$$

$$N(a/3^n) = 4^n \times N(a)$$

$$N(r) \times r^d = 1 \quad \text{si} \quad r = 3^{-n} \quad \text{et} \quad d = \log_3(4)$$

La dimension de la courbe vaut $d = \log_3(4) \approx 1,26$

Définition de la dimension

La dimension d'un ensemble K est définie par

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{\log(N(r))}{-\log(r)}$$

où $N(r)$ est le nombre de boules de rayon r nécessaires pour recouvrir K

Quelques exemples

$$d = \log_3(4)$$

$$d = \log_2(3)$$

$$d = 1$$

$$d = 3/2$$

Et le dimension de la côte bretonne ?

$d \approx 1,2$

Au-delà des ensembles, les mesures

un exemple : la mesure de surface

Au-delà des ensembles, les mesures

un exemple : la mesure de surface

Au-delà des ensembles, les mesures

un exemple : la mesure de surface

Au-delà des ensembles, les mesures

un exemple : la mesure de surface

Au-delà des ensembles, les mesures

un exemple : la mesure de surface

Au-delà des ensembles, les mesures

un exemple : la mesure de surface

$$m_3(K) = 13 \times 1/64 = 0,203125$$

Au-delà des ensembles, les mesures

un exemple : la mesure de surface

$m_1(K), m_2(K), m_3(K), \dots, m_6(K), \dots, m_n(K), \dots$

Mesures autosimilaires

0,31	0,29
0,27	0,13

Mesures autosimilaires

Mesures autosimilaires

Mesures autosimilaires

Mesures autosimilaires

Mesures autosimilaires

$$m = 0,31m_1 + 0,29m_2 + 0,27m_3 + 0,13m_4$$

où m_1, m_2, m_3, m_4 sont semblables à m

Mesure multifractale : un aperçu

$$E_a = \left\{ x \text{ tels que } m(B(x,r)) \approx r^a \right\}$$

Mesure multifractale : un aperçu

$$E_a = \left\{ x \text{ tels que } m(B(x,r)) \approx r^a \right\}$$

Mesure multifractale : un aperçu

$$E_a = \left\{ x \text{ tels que } m(B(x,r)) \approx r^a \right\}$$

Mesure multifractale : un aperçu

$$E_a = \left\{ x \text{ tels que } m(B(x,r)) \approx r^a \right\}$$

Mesure multifractale : un aperçu

$$E_a = \left\{ x \text{ tels que } m(B(x,r)) \approx r^a \right\}$$

Un exemple jouet : la mesure de Bernoulli

Le spectre de la mesure de Bernoulli

$p = 0,15$

$p = 0,25$

$p = 0,40$

$p = 0,50$

Remerciements

- À Andrzej Stos
pour son aide dans la conception des animations
- À Claude Tricot
pour sa vision géométrique toujours éclairante et
pour les nombreuses discussions partagées
- À Sophie Delhaye
pour son aide dans la réalisation de ce diaporama